

2019年5月14日

各 位

# 新規殺虫剤「グレーシア®乳剤」の国内販売開始について

日産化学株式会社(本社:東京都中央区、社長:木下小次郎)は2019年1月22日に農薬登録を取得した新規殺虫剤「グレーシア®乳剤」を5月15日より販売開始いたしますので、お知らせいたします。当社は、中期経営計画「Vista2021」の中で、農業化学品事業の成長の源泉として、殺虫剤「グレーシア®」を掲げており、国内外での売上100億円を目指していきます。

「グレーシア®乳剤」は、既存剤とは異なる作用性を有する「フルキサメタミド」(IRAC ナンバー※【30】)を有効成分とする野菜・茶用殺虫剤です。有効成分である「フルキサメタミド」の活性本体が、害虫に直接届き、素早く作用します。極めて広範囲の重要害虫に有効であり、既存剤に抵抗性を持った害虫に対しても優れた効果を示します。また、訪花昆虫であるミツバチへの影響が少ないなどの特長を有することから、栽培作物を害虫被害から守り、安定的に収穫量を確保することに貢献します。

当社は、今後も農薬・医薬品のパイプラインの充実をはじめとする、ライフサイエンス事業の発展に 取り組んでまいります。

### <グレーシア®乳剤の特長について>

- ・新規有効成分「フルキサメタミド」配合。抵抗性の害虫にも卓効がある。
- ・有効成分が害虫に直接作用するので、栽培作物が被害を受ける前に害虫を駆除できる。
- ・幅広いチョウ目害虫に卓効があり、アザミウマ、コナジラミ、ハモグリバエ、ハダニ類、ホコリダニ、サビダニなどの同時防除も可能。
- ・ミツバチ、マルハナバチなどの訪花昆虫にも影響が少ない。
- ・約2週間の殺虫効果。
- ・葉内に薬剤が浸透し、葉裏の害虫にも効果がある。
- ・耐雨性が高く、散布後に雨が降っても効果が落ちづらい。
- ・高温/低温など様々な環境下でも効果が安定。

#### ※IRAC ナンバー

殺虫剤について作用機構別に分類したコード(番号、記号)。IRAC [クロップライフインターナショナル(世界農薬工業連盟)の殺虫剤抵抗性対策委員会]が作成している。



<製品概要>

◇製品名:グレーシア®乳剤

◇登録番号:第24185号

◇販売開始日:2019年5月15日

◇販売会社:日産化学(株)

◇荷姿 250ml×40 本、500ml×20 本

◇適用作物・害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	7ルキサメタミト <sup>*</sup> を含む 農薬の総 使用回数
さといも かんしょ	ハスモンヨトウ ナカシ゛ロシタハ゛						
だいこん	コナカ゛ ハイマタ゛ラノメイカ゛ カフ゛ラハハ゛チ キスシ゛ノミハムシ						
はくさい	ハスモンヨトウ	2000~ 3000 倍		収穫7日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
キャベツ	コナカ゛ アオムシ ウワハ゛類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタハ゛コカ゛ ネギアサ゛ミウマ		収穫 100~ 300L/10a				
カリフラワー	コナカ゛ アオムシ						
ブロッコリー	コナカ゛ アオムシ ヨトウムシ						
レタス 非結球レタス	ナモク゛リハ゛エ			収穫3日前まで			
たまねぎ	ネギアザミウマ						
ねぎ	ネキ゛コカ゛ ネキ゛ハモク゛リハ゛エ ネキ゛アサ゛ミウマ			収穫7日前まで			



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	7ルキサメタミト <sup>*</sup> を含む 農薬の総 使用回数
トマト	ハスモンヨトウ コナシ゛ラミ類 トマトハモク゛リハ゛エ	2000 倍	100~ 300L/10a 収穫 14 日前まで 収穫前日まで	収穫前日まで	2 回以内	散布	2 回以内
ピーマン	オオタハ゛コカ゛						
なす	コナシ゛ラミ類 アサ゛ミウマ類 ハタ゛ニ類 チャノホコリタ゛ニ						
きゅうり	アサ゛ミウマ類 ハスモンヨトウ ウリノメイカ゛ トマトハモク゛リハ゛ェ ハタ゛ニ類						
すいか	アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類						
メロン	アサ゛ミウマ類 コナシ゛ラミ類 ウリノメイカ゛ ハタ゛ニ類						
だいず	マメシンクイカ゛ ハスモンヨトウ	2000~ 3000 倍		収穫 14 日前まで			
豆類(未成熟、 ただし、えだま め、さやえんど うを除く)	ハスモンヨトウ						
さやえんどう	ハスモンヨトウ ナモク゛リハ゛エ						
えだまめ	マメシンクイカ゛ ハスモンヨトウ			(大)受削 日 よ く			
いちご	アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハダニ類	2000 倍					



作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルキサメタミト* を含む 農薬の総 使用回数
茶	チャノコカクモンハマキ ヨモキ゛エタ゛シャク チャノホソカ゛ チャトケ゛コナシ゛ラミ	2000 倍	200~ 400L/10a	摘採 14 日前まで	1回	散布	1 回
	サヒ゛タ゛ニ類 チャノホコリタ゛ニ	2000~ 3000 倍					
きく	ハスモンヨトウ ナミハタ゛ニ	2000 倍	100∼ 300L/10a	発生初期	2 回以内		2 回以内

## 報道機関の皆さまのお問い合わせ先

日産化学株式会社 経営企画部 CSR・広報室 TEL:03-4463-8123

E-mail: csr\_pr@nissanchem.co.jp

## 商品に関するお問い合わせ先

日産化学株式会社 農業化学品事業部マーケティング部

TEL:03-4463-8271

E-mail: enq\_agri@nissanchem.co.jp